


Injection

LINCORIQ

Lincomycin HCl + Spectinomycin HCl



Drop of Life



www.baariqpharma.com

Injection

LINCORIQ

Lincomycin HCl + Spectinomycin HCl

COMPOSITION:

Each ml contains:-

Lincomycin as HCl (B.P)----- 50 mg

Spectinomycin as HCl (B.P)----- 100 mg

Product complies with Baariq specifications

INDICATIONS:

Cattle: Treatment of pneumoenteritis, this includes enteritis and pneumonia.

Sheep & Goats: Treatment of contagious foot rot caused by bacteroides nodosus and respiratory infection.

Dogs & Cats: Treatment of respiratory infections, skin infections, abscesses and Complications, recurrent ear infections.

Poultry: Treatment of airsacculitis (CRD or CCRD), fowl cholera, staphylococcal infection.

DOSAGE:

Cattle: 1ml IM per 10kg body weight twice daily the first day followed by once daily 2 to 4 days.

Sheep & Goats: 1ml IM per 10kg body weight twice daily for 3 days.

Dogs & Cats: 1ml IM per 5kg body weight may be repeated at 12 or 24 hours intervals for up to 21 days.

Poultry: 1ml SC per 5kg body weight once daily for 3 days.

PRECAUTIONS:

WITHDRAWAL TIME: Meat: 14 days. Milk: 48 hours.

Do not use in late pregnancy.

Consult the veterinarian before use.

Keep out of the reach of children.

Store below 25 degree centigrade in a cool and dry place.

For better results use medicine as per recommended dose.

انجکشن

لنکورق

لنکومائی سین ہائیڈروکلورائیڈ + سپیکٹینومائی سین ہائیڈروکلورائیڈ

اجزائے ترکیبی:

ہر ملی لیٹر میں شامل ہے۔

لنکومائی سین بطور ہائیڈروکلورائیڈ (بی پی) ----- 50 ملی گرام
سپیکٹینومائی سین بطور ہائیڈروکلورائیڈ (بی پی) ----- 100 ملی گرام

علامات:

مویشی: مویشیوں میں نیومونٹرائٹس کے علاج کے لیے۔

بھینر، بکری: میں Foot rot اور Respiratory بیماریوں کے لیے۔

کتا، بلی: میں جسمانی، کان وغیرہ کی بیماریوں کے لیے۔

پولٹری: مرغیوں میں ایئر سیکولائٹس (سی آر ڈی یا سی سی آر ڈی)

فاول کولرا، سٹیفائیڈوکل انفیکشن کے علاج کے لیے۔

خوراک:

مویشی: 1 ملی لیٹر فی 10 کلوگرام وزن کے مطابق دن میں 2 مرتبہ پہلے دن
اس کے بعد ایک بار روزانہ 2 سے 4 دن تک۔

بھینر، بکری: 1 ملی لیٹر فی 10 کلوگرام وزن کے مطابق دن میں 2 مرتبہ 3 دن تک۔

کتا، بلی: 1 ملی لیٹر فی 5 کلوگرام وزن کے مطابق ہر 12 سے 24 گھنٹے کے
وقفے کے بعد 21 دن تک۔

پولٹری: 1 ملی لیٹر فی 5 کلوگرام وزن کے مطابق ایک بار روزانہ 3 دن تک۔

احتیاطیں:

14 دن تک گوشت اور 48 گھنٹوں کے لیے دودھ استعمال نہ کریں۔

روشنی اور حرارت سے محفوظ رکھیں۔

ٹھنڈی اور خشک جگہ پر رکھیں۔

تمام ادویات بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں۔

Available: 50ml, 100ml

صرف جانوروں کے استعمال کیلئے

For Veterinary Use Only

بہترین نتائج کیلئے دوا کو مقررہ مقدار میں استعمال کریں۔

Certified by :



IAS
Accredited



GMP
Good
Manufacturing
Practices



BAARIQ
PHARMACEUTICALS
Manufacturer & Exporter Of Animals Health Division

Certified by :



ISO
Quality
Management
System RICI



ISO
Environmental
Management
System RICI