

PRO-CRD

Tylosin Tartrate + Colistin Sulphate + Streptomycin

www.baariqpharma.com

Injection

# PRO-CRD

Tylosin Tartrate + Colistin Sulphate + Streptomycin



### **COMPOSITION:**

Each ml contains:-

Tylosin Tartrate (B.P)----- 50 mg Colistin Sulphate(B.P)------10 mg

Streptomycin(B.P)----- 100 mg

Product complies with Baariq Specifications

#### **INDICATIONS:**

For effective control and treatment of severe respiratory infections of bacterial origin including CRD, CCRD, ORT, infectious coryza, fowl cholera etc.

#### DOSAGE

:1ml per 7kg body weight for 3 days. Cattle Sheep & Goats: 1ml per 7kg body weight for 3 days. :1ml per 7kg body weight for 3 days. Dogs & Cats

:0.3ml per kg body weight. Poultry

#### PRECAUTIONS:

WITHDRAWAL TIME: Meat: 7 days. Milk: 7 days. Do not use in late pregnancy. Consult the veterinarian before use. Keep out of the reach of children. Store below 25 degree centigrade in a cool and dry place.

For better results use medicine as per recommended dose.

ٹائلوسین ٹارٹریٹ + کوسٹین سلفیٹ + سٹریپٹو مائیسن

#### اجزائير كيبي:

ہرملی لیٹر میں شامل ہے۔ ٹاکلوسین ٹارٹریٹ (بی پی)۔۔ ---50 ملى كرام كولسين سلفيك (بي بي) \_\_\_\_\_ 10 ملى گرام سٹریپٹو مانکیسن (بی بی)۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

پروسی آر ڈی بیکٹیریا سے بھیلنے والی نظام انہضام کی بیاریوں خصوصًا سی آرڈی ، سی سی آر ڈی، فاول کالرہ، اوآرنی وغیرہ میں انتہائی موثر ہے۔

مولیثی 1 ملی لیٹر فی 7 کلوگرام وزن کے مطابق 3 دن تک۔

1 ملی لیٹر فی 7 کلوگرام وزن کےمطابق 3 دن تک۔ بھیڑ، بکری

1 ملی لیٹر فی 7 کلوگرام وزن کے مطابق 3 دن تک۔ کتا، بلی بولٹری

3.0 ملی لیٹر فی کلو گرام وزن کے مطابق دیں۔

7 دن تک گوشت اور 7 دن کے لیے دودھ استعال نہ کریں۔ روشنی اور حرارت سے محفوظ رکھیں۔ محفظ کی اور خشک جگہ پر رکھیں۔ تمام ادویات بچوں کی پہنچ سے دوررکھیں۔

صرف جانوروں کے استعال کیلئے

Available: 50ml, 100ml

For Veterinary Use Only

## Certified by:







# Certified by:



ISO Quality Management System RICI



ISO **Environmental** Management System RICI